

Nom scientifique

Duranta erecta

Verbénacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

duranta, vanillier de Cayenne

Noms anglais

golden dewdrop, pigeon berry

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Subspontanée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Duranta erecta

Atteignant 5 m de haut et 20 cm de diamètre, aux rameaux parfois épineux ; feuilles ovale, longues de 1,5 à 5 cm pour 0,5 à 4 cm de large ; inflorescences longues de 15 cm et comprenant plusieurs dizaines de fleurs ; fleurs lilas dotées d'un tube et de 5 lobes, larges de 12 mm ; fruit jaune à maturité, de 6 à 12 mm de diamètre, comprenant 8 graines noyées dans une pulpe. Introduit pour ses fleurs et ses fruits à intérêt ornementaux.

Nectar	Pollen	Miellat
X	X	

Oudart (2015), Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Rare	Rare	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Rare	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Rare	Rare
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Rare	Rare	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	



CHAMBRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE LAGONAIRE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE