Nom scientifique

Youngia japonica

Astéracées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

Laiteron jaune

Noms anglais

Oriental false hawksbeard

Type biologique

Herbacée

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones cultivées, pistes agricoles et forestières

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Youngia japonica

Herbe de moins de 50 cm ; feuilles en rosette basale, oblancéolées et lobées, de 2 à 20 cm de long sur 0,5 à 5 cm de large ; inflorescences regroupant plusieurs têtes aux involucres de 3,5 à 5 mm de haut ; fleurs en languette au nombre de 10 à 20 par têtes, les languettes longues de 3 à 4 mm, jaunes ; akènes bruns de 1,5 à 2,5 mm de long.

Nectar	Pollen	Miellat
X	X	

Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
	Rare	Rare

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Rare	Peu commun	Peu commun

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Rare		

Tuamotu Centre	Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
		ma'a rapiti

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre	Tuamotu Est

CHAMBRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE LAGONAIRE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE